

## Пищуха северная (лат. *Ochotona hyperborea*)

Семейство Пищуховых (Ochotonidae)

Отряд Зайцеобразных (Lagomorpha).

Появление пищух на земле относят к олигоценовому периоду, они появились примерно 23 миллиона лет назад.

Северные пищухи обитают на горных ландшафтах Центральной Азии, с ее резко континентальным климатом, характеризующимся значительными перепадами суточной температуры.



На смену жаркому изнуряющему лету приходят морозные снежные зимы. Места обитания пищух не отличаются многообразной растительностью. Там преобладают кустарники, злаки и травы.

Северные пищухи занимают норы, вырытые другими животными. Свое жильё зверек обустроивает с комфортом. Он устилает его подстилкой из сухой травы. Подземная квартира состоит из одного жилого помещения и до 5 аварийных выходов.

Как правило, представители данного вида проживают колониями. У каждой семьи имеется отдельная норка с приусадебным участком. Соседи располагаются на небольшом расстоянии друг от друга. Каждый вечер жители одной колонии устраивают громкие переключки, которые слышны на дальних расстояниях. Тревожными криками они предупреждают об опасности.

Длина тела достигает 25 см, а вес до 200 г. Верхняя губа посередине раздвоена. Широкие и короткие уши имеют слегка закругленную форму. мех короткий и жесткий.

Свой окрас зверек меняет зависимости от времени года. Летом у него шубка приобретает охристо-бурый окрас с мелкими черными пятнышками.

Маленький хвостик напоминает жировой бугорок и спрятан в шерсти. Задние конечности имеют 4 пальца, а передние коротенькие лапки снабжены пятью пальцами. Все пальцы заканчиваются острыми коготками.

Продолжительность жизни северной пищухи не превышает 2 лет.

